

-  Marca **Ibuprofeno**
-  Quantidade **20ml**
-  Princípio Ativo **Ibuprofeno**

Descrição do produto

Para que serve o Ibuprofeno?

O ibuprofeno é um medicamento indicado para redução da febre e para o alívio de dores, tais como: dores decorrentes de gripes e resfriados, dor de garganta, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, cólicas menstruais e dores musculares.

Como usar o Ibuprofeno?

USO ORAL

Agite antes de usar.

Não precisa diluir.

Suspensão oral (gotas) 50 mg/mL

Crianças

A dose recomendada para crianças a partir de 6 meses de idade pode variar de 1 a 2 gotas/Kg de peso, em intervalos de 6 a 8 horas, ou seja, de 3 a 4 vezes ao dia.

A dose máxima por dose em crianças menores de 12 anos de idade é de 40 gotas (200 mg) e a dose máxima permitida por dia é de 160 gotas (800 mg).

Adultos

Em adultos, a dose habitual do ibuprofeno gotas 50 mg/mL, para febre é de 40 gotas (200 mg) a 160 gotas (800 mg), podendo ser repetida por, no máximo, 4 vezes por dia.

A dose máxima permitida por dia em adultos é de 640 gotas (3.200 mg).

Suspensão oral (gotas) 100 mg/mL

Crianças

A dose recomendada para crianças a partir de 6 meses de idade é de 1 gota/Kg de peso, em intervalos de 6 a 8 horas, ou seja, de 3 a 4 vezes ao dia.

A dose máxima por dose em crianças com mais de 30 Kg é de 20 gotas (200 mg) e a dose máxima permitida por dia é de 80 gotas (800 mg).

Adultos

Em adultos, a dose habitual do ibuprofeno gotas 100 mg/mL é de 20 gotas (200 mg) a 80 gotas (800 mg), podendo ser repetida por, no máximo, 4 vezes por dia.

A dose máxima permitida por dia em adultos é de 320 gotas (3.200 mg).

Dose recomendada por no máximo, 4 vezes ao dia:

Peso (kg)	50mg/ml		100mg/ml	
	Febre baixa (<39°C)	Febre alta (≥39°C)	Febre baixa (<39°C)	Febre alta (≥39°C)
5	5 gotas	10 gotas	3 gotas	5 gotas
6	6 gotas	12 gotas	3 gotas	6 gotas
7	7 gotas	14 gotas	4 gotas	7 gotas
8	8 gotas	16 gotas	4 gotas	8 gotas
9	9 gotas	18 gotas	5 gotas	9 gotas
10	10 gotas	20 gotas	5 gotas	10 gotas
11	11 gotas	22 gotas	6 gotas	11 gotas
12	12 gotas	24 gotas	6 gotas	12 gotas
13	13 gotas	26 gotas	7 gotas	13 gotas
14	14 gotas	28 gotas	7 gotas	14 gotas
15	15 gotas	30 gotas	8 gotas	15 gotas
16	16 gotas	32 gotas	8 gotas	16 gotas
17	17 gotas	34 gotas	9 gotas	17 gotas
18	18 gotas	36 gotas	9 gotas	18 gotas
19	19 gotas	38 gotas	10 gotas	19 gotas
20	20 gotas	40 gotas	10 gotas	20 gotas
21	21 gotas	40 gotas	11 gotas	20 gotas
22	22 gotas	40 gotas	11 gotas	20 gotas
23	23 gotas	40 gotas	12 gotas	20 gotas
24	24 gotas	40 gotas	12 gotas	20 gotas
25	25 gotas	40 gotas	13 gotas	20 gotas
26	26 gotas	40 gotas	13 gotas	20 gotas
27	27 gotas	40 gotas	14 gotas	20 gotas
28	28 gotas	40 gotas	14 gotas	20 gotas
29	29 gotas	40 gotas	15 gotas	20 gotas
30	30 gotas	40 gotas	15 gotas	20 gotas
31	31 gotas	40 gotas	16 gotas	20 gotas
32	32 gotas	40 gotas	16 gotas	20 gotas
33	33 gotas	40 gotas	17 gotas	20 gotas
34	34 gotas	40 gotas	17 gotas	20 gotas
35	35 gotas	40 gotas	18 gotas	20 gotas

36	36 gotas	40 gotas	18 gotas	20 gotas
37	37 gotas	40 gotas	19 gotas	20 gotas
38	38 gotas	40 gotas	19 gotas	20 gotas
39	39 gotas	40 gotas	20 gotas	20 gotas
40	40 gotas	40 gotas	20 gotas	20 gotas

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Quando não devo usar o Ibuprofeno

Não utilize este medicamento se você já teve qualquer alergia ou alguma reação incomum a qualquer um dos componentes da fórmula do produto.

Este produto contém ibuprofeno que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais a asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

Não utilize o ibuprofeno caso tenha apresentado alguma reação alérgica ao ácido acetilsalicílico e a outros anti-inflamatórios. Não utilize este produto contra a dor por mais de 10 dias ou contra a febre por mais de 3 dias, a menos que seja prescrito pelo médico. Não ultrapasse a dose recomendada.

Não tome este produto com outros medicamentos contendo ibuprofeno ou outros medicamentos para dor, exceto sob orientação médica.

Não utilize este medicamento em casos em que o ácido acetilsalicílico, iodeto e outros anti-inflamatórios não esteroides tenham induzido asma, rinite, urticária, pólipos nasal, angioedema, broncoespasmo e outros sintomas de reação alérgica ou anafilática.

Não utilizar ibuprofeno junto com bebidas alcoólicas.

Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com úlcera gastroduodenal ou sangramento gastrointestinal.

Este medicamento é contraindicado para menores de 6 meses de idade.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MEDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASOS DE ÚLCERA, GASTRITE, DOENÇA DOS RINS OU SE VOCÊ JÁ TEVE REAÇÃO ALÉRGICA A ANTIINFLAMATÓRIOS. MEDICAMENTO GENÉRICO - LEI º 9.787/99.

Características

Código do produto	32723
Fabricante	Medley
Registro MS	1832601940029
Dosagem	100MG

Quem comprou, também se interessou



Paracetamol 750mg 20 comprimidos EMS...

20 Comprimidos

Sem estoque

Receber aviso quando disponível?



Ibuprofeno 50mg/ml Suspensão Oral Sabor...

30ml

Sem estoque

Receber aviso quando disponível?



Dorflex MAX Analgésico e Relaxante Muscular 4...

4 Comprimidos

Sem estoque

Receber aviso quando disponível?



Tylenol Paracetamol 750mg Múltiplas Dores 10...

10 Comprimidos

Sem estoque

Receber aviso quando disponível?



Neosaldina Muscular M Dipirone 600mg + Cafe 8 Comprimidos

8 Comprimidos

Sem estoque

Receber aviso quando disponível?

Similares que você pode se interessar



Medley

ibuprofeno
50mg/ml
SUSPENSÃO ORAL
Sabor...
Medley Generico

ALÍVIO DE FEBRE E DORES

Ibuprofeno 50mg/ml
Suspensão Oral Sabor...



Garmed

ibuprofeno
100mg/ml
SUSPENSÃO ORAL
20ml
Garmed Generico

Ibuprofeno 100mg/ml
Suspensão Oral 20ml...



ibuprofeno
100mg/ml
SUSPENSÃO ORAL
20ml
Cimed Generico

Ibuprofeno 100mg/ml
Cimed Suspensão Oral...



PRODUTO SEM IMAGEM

Ibuprofeno 100mg/ml 20ml
Suspensão Gotas Nova...



TEUTO

ibuprofeno
50mg/ml
SUSPENSÃO ORAL
30ml
Teuto Generico

Ibuprofeno 50mg/ml
Suspensão Oral 30ml Ti



Bula Ibuprofeno

Princípio Ativo: Ibuprofeno

Tenha cuidado, leia a bula, a automedicação pode colocar a sua saúde em risco. Só use medicamentos com orientação médica e/ou farmacêutica.

[Ler bula do Ibuprofeno](#) 

